

**Posiadacz zezwolenia:**

Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, ul. Rybickiego 15/17; 96-100 Skierniewice, tel. +48 46 834 80 53 fax. +48 46 834 80 23; e-mail: sbgu@sbgu.com.pl

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium RP:**

Agrofarm Sp. z o.o., ul. Dzika 4A/58; 00-194 Warszawa, tel./fax +48 22 810 11 37; e-mail: biuro@agrofarm.pl

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:**

Schirm GmbH; Geschwister-Scholl-Strasse 127; 39218 Schönebeck (Elbe), Republika Federalna Niemiec

## PYRIX 20 SL

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

**piryproksyfen** (związek z grupy pochodnych eterowych pirydyny) - 20 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R/j- 1/2026 z dnia 22.06.2026 r.  
na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin PYRIX 20 SL  
w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 10 listopada 2026 r.



H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 –Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną

P273- Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 – Zebrać wyciek.

### OPIS DZIAŁANIA

PYRIX 20 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym, i żółdkowym do zwalczania muchówek (*Sciaridae*) w uprawie pieczarek.

Środek działa jako analog hormonu juvenilnego, zakłóca równowagę hormonalną u owadów powodując zaburzenie procesów rozwojowych. Działa głównie w fazie larwalnej hamując proces linienia i przeobrażania larw do kolejnych stadiów rozwojowych, co prowadzi do ich zamierania.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

## STOSOWANIE ŚRODKA

### Pieczarka

muchówki (*Sciaridae*)- larwy

**Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:**

**15 ml środka na 1 m<sup>2</sup> uprawy stosując 1L wody.**

### Termin stosowania środka:

Faza rozwojowa rośliny uprawnej podczas zabiegu w skali BBCH: przerost okrywy przez grzybnię pieczarki.

Opryskiwać półki do 2 dni po nałożeniu okrywy. Szczególnie dokładnie potraktować brzeżne części półek.

## OKRESY KARENCJI

*Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):*

nie dotyczy

## SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

## POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK< PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH:

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy, odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) oraz ochronę dróg oddechowych zabezpieczającą przed oddziaływaniem środka ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną podczas wkraczania na obszar po zabiegu.

*Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):*

Nie dotyczy

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód i gleby środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0 °C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....